

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元壬集卷之九

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國

校

龔安國

南雍太學生龔印周文卿光霽堂鈔

外科諸證

癰疽

夫癰疽瘡瘍者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服甘石燥熱之藥熱毒結深而發為癰疽也夫此疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙煇安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻而成

血而成也。癰者，壅也。大而高起，屬于陽。六腑之氣所生也。其脉浮數。疽者，沮也。平而內發，屬乎陰。五臟之氣所成也。其脉沉數。瘡者，其總名也。癰者，有頭小瘡也。經云：諸痛痒瘡皆屬心火。蓋心主血而行氣。若氣血凝滯，夾心火之熱而生癰疽之類也。然所感有淺深，故所發有輕重大小之不同也。六腑積熱，騰出於外，肌肉之間，其發暴甚，皮腫尤軟，侵襲廣大者，癰也。五臟風毒積熱，攻注於肌肉，其發猛烈，初生一頭如瘡，癰白色焦枯，觸之而痛，應心者，疽也。熱發於皮膚之間，是以浮腫，根小不過二三寸者，癰也。夫癰生於六腑，若燎原之火，外潰肌肉，疽生於五臟，沉澹難療。若陶室之燧，內消骨髓，癰則易療，惟難將息，而遲癰疽則難療而易痊復。夫諸瘡之中，惟背疽疔瘡最爲急証，其次莫如腦疽、腸癰、喉癰之類，亦其急者也。至若瘰癧、懸癰、痔漏諸瘡之類，其証可緩而治也。又若疥癬、臙瘡、風疳之類，雖云俱屬瘡類，而其輕重緩急自有不同也。夫癰疽之疾，須要察其是實是虛，是冷是熱，或重或輕，酌症用藥，無

失先後次序。凡人年四十已上。頭頂發顛。背脊腰脇。或筋骨之上。所視  
不見之處。稍有瘡癰。便不可輕易待之。若視之怠慢。以爲常疾。每是從  
微至顛。喪命者多矣。便宜速急治之。庶幾得救。譬之救火。初起則易撲。  
至於燎原之勢。不可撲滅矣。其理亦由是也。凡瘡未破。毒攻臟腑。下毒  
藥斷不可用。若已破潰。臟腑既虛。飲食不進。下毒冷藥。亦不可用。此  
是先後次第之要訣也。夫瘡有五善七惡。不可不辨。若動息自寧。飲食  
知味。一善也。便利調勻。一善也。膿潰腫消。色鮮不臭。二善也。神彩精明。  
語聲清朗。四善也。體氣和平。五善也。如煩躁時。咳嗽腹痛。渴甚。泄利無度。  
小便如淋。一惡也。膿血太泄。痼痛尤甚。臭惡難近。二惡也。喘急短氣。恍  
惚嗜卧。三惡也。未潰先黑。久陷面青唇黯。便汚者。四惡也。有項不便。四  
肢沉重。五惡也。不能下食。服藥而嘔。食不知味。六惡也。聲嘶色脫。唇鼻  
青黑。面目四肢浮腫。七惡也。更有氣噎。痞塞。咳逆。身冷自汗。無時目眩。  
耳聾。恍惚驚悸。語言顛倒。皆是惡証。五善見三則善。七惡見四必危。五

善併至則吉而安七惡全見必危而死矣。

審症虛實訣

一凡大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急宜破之無膿但氣腫若有血慎之慎之不可針破也用諸拔毒之藥敷放四圍堅中軟者此爲有膿審也一邊軟亦可有膿都堅者此爲惡核或有氣也都軟者此爲有血血瘤也當審堅軟虛實爲要若堅疽積久後若更變熱偏有軟處當軟處切不可針破也軟疽者溫煖暴衣置之耳若針灸刺破不可療也。

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羊鵝肉燒酒麵食生冷瓜果醃菜等物瘡口斂百日後不作渴症者方可入房。

凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時如往有喪之家男婦并拜望等項其瘡腫卽復發切忌切忌

### 用藥治法

凡癰疽等項本瘡毒初起一二三日內卽服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至將潰之際俱可服服後汗出將惡毒盡皆發散腫痛立消其効如神若瘡已潰爛勿服如無神駿膏初起卽服槐花酒或千金消毒散一二劑患處卽用灸法灸之瘡初出至七日內皆可灸七日後不可灸瘡未及灸初起卽以葱蜜膏或金蟾膏貼之卽消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之立効敷之至六七日作膿將潰未潰之時不得頂破用替針丸頻點瘡頭自然皮破出膿瘡自初起至此膿將出未出之際卽服真人活命飲一二劑瀉下膿血其瘡潰爛用猪蹄湯洗淨以三神膏搽之內服千金內托散以托瘡毒出外間服蠟礬丸以護膈膜二藥相應服之勿間不計其數再看潰爛流膿不止此氣血衰憊脾胃虧損肌肉

不生瘡不歛口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減八味丸可以絕根庶免再生若平日無瘡時常預服之尤為防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏效者皆予百發百中之良法也

○一論飛龍奪命丹乃外科惡毒第一方也方見後諸瘡

○一論癰疽發背瘰癧鼠瘻氣癰等症此專門之方其効捷如奔馬

飛騰神駿膏

麻黃二斤去節取

杏仁四兩

同搗熱水泡去皮尖用砂鉢搗爛又入水

防風去蘆淨四兩

地骨皮去骨淨四兩

甘草四兩

木鼈子去殼十四

頭髮一大把

溫水

燈草一大把

黑鉛一塊

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用木銅鍋一口將前藥入鍋內注清水二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將

前渣入鍋內再入水一二桶又熬至五六分藥汁又注前沙內如前法  
三次去渣將前二次汁并作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮燈草等味不用  
其味香甜磁罐收貯五年不壞遇病每服三錢好熟酒調膏臨卧時  
被蓋出大汗爲度徐徐去被不可被風吹次早用猪蹄煨食汗後思  
虛入以此補之以復元氣好酒調服隨入酒量以醉爲度汗出立愈此  
治瘡毒初起至潰破時前後皆可服神效

○一論凡人初患癰疽發背已結未結赤熱腫痛卽用灸法先以蒜紙  
覆其上立視後其紙先乾處卽是結疽頭處取大蒜去皮橫切三五錢  
厚安在頭上用木炭炷於蒜上灸之三壯換一蒜片復灸痛者灸至不  
痛不痛灸至痛方住最要早覺早灸爲上方發一二日者十灸十愈三  
四日者六七愈五六月者三四愈過七日則不可灸矣若有十數頭下  
處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上一處  
赤腫內有一粒黃如粟米者卽用獨蒜切片如前法灸之次日去癰膿



自潰矣。

○一論凡癰疽發背一切無名腫毒初起

葱蜜膏

生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次即消  
金蟾膏 治疔同前

生白礬末五錢加麝香一分取活蝦蟆一箇去腸肚同搗爛如泥四圍留頂出氣不過一夜即愈

○一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但癰痛者

槐花酒

槐花四五兩炒黃乘熱入酒二鍾煎十餘沸去渣熱服其毒即癰潰  
○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜

黑白牽牛各二兩搗碎好酒一碗煎八分露一宿次日溫服本使下膿血即愈

○一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤瘰癧疔腫魚口五癰癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤澀等証並治妊娠勿服千金消毒散

連翹二錢

黃芩一錢

赤芍一錢

當歸尾一錢

金銀花一錢

皂角刺一錢

天花粉一錢

牡蠣一錢

麻黃一錢

防風一錢

大黃一錢

芒硝一錢

右剉丁劑酒水各半煎服。

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起即消已腫即潰血從大便中出瘡口後勿服。

加減真人活命飲 又名千金內消散

當歸尾

赤芍一錢

白芷一錢

木鼈子 去殼一錢

穿山甲

三錢

金銀花

皂角刺一錢

白殭蠶一錢

瓜蒌仁

去殼一錢

天花粉一錢

乳香一錢

沒藥五分

大黃三錢

甘草節五分

右坐一劑水酒煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐刺不可忍者登時痛止。

芙蓉膏

芙蓉葉

黃荊子各等分爲末

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處置頂如烟起此方用在未潰之先或將潰之際。

○一治癰疽發背已潰爛者。

三神膏

草麻子仁一合

陳醋一大碗

鹽一撮

右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用鷄翎續續掃上其皮卽皺其肉卽生。

○一論諸瘡惡毒發背癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然內消。

加味蠟礬丸

黃蠟一兩

枯白礬一兩

乳香一錢

沒藥一錢

雄黃二錢

右為細末用蠟鎔化為丸。朱砂為衣。如梧子大。每服五十九。視瘡上下。蜜水送下。

○一論癰疽瘡瘍皆由氣血凝滯。風毒壅結。此藥發散外邪。流行氣血。排膿止痛。生肌長肉之劑。當用於五六月間已潰未潰而作痛者宜服之。加味千金內托散。

黃芪 鹽水炒 人參

當歸 酒洗 川芎

白芍 酒炒

白芷 防風

川厚朴 姜炒 桔梗

官桂

瓜蒌仁 去殼 金銀花

甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問証候猛惡未成者自散已成者即潰矣○痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當體類而長之可也或見腫平痛寬遂以為安漫不知有無補接調養之功愈後虛証復見因而轉為他病而危劇者多矣

### 收功萬全湯

黃芪蜜水炒一錢五分人參一錢

當歸身一錢五分川芎七分

官桂三分白芷三分

防風五分

白朮去蘆炒一錢白茯苓去皮一錢

白芍酒炒七分懷熟地黃一錢

陳皮五分甘草三分

右剉一劑生薑一片水煎溫服○如作渴加麥門冬五味子○如煩燥

加生地黃麥門冬。○如有痰加薑襲半夏。○如泄瀉加厚朴薑炒。○如小便不利加澤瀉。○如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒。○如胸膈不寬加厚朴薑炒山查肉。○右方治癰疽發背諸瘡毒潰膿後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合口膿清欲作餘症者宜之。

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者。

八仙糕

人參 去蘆四兩

白茯苓 去皮四兩

乾山藥 四兩

芡實 去壳四兩

蓮肉 去心四兩

不油白朮

去蘆米泔浸過宿切片微炒四兩

白糖霜 一斤半

白粳米 二升水淘淨磨極細末

右將藥末米粉糖霜和勻處揉極勻篩放籠內竹刀割成小片入鍋再焙乾任意食之。

敷瘡止痛生肌散

官粉

火煨黃色

黃柏一錢

黃連

乳香

沒藥

孩兒茶各五分

右爲末摻瘡上并治下疳黃水熱泡等瘡

○一論癰疽發背潰爛便要此湯盥洗  
猪蹄湯

當歸

赤芍

白芷

羌活

露蜂房

生甘草

各五錢

一方加黃芩

右細剉看瘡大小用藥如瘡大加料用之先將豬蹄前蹄兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分爲兩次擦去上面油花并下面渣肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火煎十數沸去渣以故帛蘸藥湯溫溫徐徐薄揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以布帛拭乾貼膏藥仍避風

忌人口氣吹之有胡臭人并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着

○一論一切惡瘡癰疽發背等症此藥能追毒去死肉有膿無頭用此點頭上自然皮破出膿

替針丸

人言為末入鍋內上蓋明礬燒不響為度一錢

硃砂五分

巴豆十粒

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香七分

右為細末麝香為丸如豆大用時以溫水磨化頻點瘡頭上神効

替針散

用木鼈子川烏二味磨水以鷄翎蘸掃瘡上留口大一處出膿乾藥水乾再刷上不干時即穿

○一論治癰疽發背癰疽發腦等太毒不拘已潰未潰俱用此敷貼如腫



毒未潰通敷自消如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神異膏貼之每日換兩三次不許見風神効

三合消毒散

文蛤搗碎炒黑色為末三兩六錢

輕粉研三錢

黃栢去皮蜜炙為末寒水石煨為末一兩

右末合為一處用新涼水一半蜂蜜一半調令不稀不稠如瘡毒尚未開將腫處通敷之用綿紙覆手上但乾即以水掃之朝夕更換二次如夏月或午時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膿破口處用神異膏滿貼之不必留口亦一日三換

一論癰疽發背潰爛久不生肌肉用此立効但此方用之不可太早合口收功散

血竭二錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨各

錢五赤石脂二錢

朱砂

海螵蛸各五分

右共爲細末散在瘡口上即生肌肉

○一論癰疽發背諸瘡處不拘已成已潰未潰者皆可用之瘡毒甚重者日換兩三次中毒換下次其藥力方能勝毒諸瘡潰膿後不長肌肉不合口者神效

神異膏

當歸尾 五錢

川芎 五錢

赤芍 二錢

生地黄 四錢

防風 五錢

羌活 五錢

白芷 五錢

玄參 五錢

黃芪 五錢

官桂 三錢

桃仁 四十个 杏仁 四十九箇

木蜜子 十四箇

何首烏 三錢

牛旁子 五錢

穿山甲 四錢

露蜂房 三錢

蛇退 二錢

大黃 二錢

黃精 二錢

亂髮

男者一團 女者一團 柳枝 四十九節 每長一寸

右用藥酒二升 甲兩 將藥入鍋內 煮至五夏三秋 長冬十日 以桑葉

文武火煎油黑色 以穿山甲浮起 暴乾 度細濾去渣 再熬 滴上成珠

陸續下黃丹十四兩柳條攪不住手成膏軟硬得所再下乳香沒藥各三錢血竭三錢降真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸二三日去水性攤用。

○一論癰疽瘡瘍。瘡後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未患先渴此腎水枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故心煩燥作渴小便頻數或自渴陽痿飲食不多肌膚消瘦或腿腫脚充瘦服此以滋腎水降心火諸症頓止及治口舌生瘡不絕。

加減八味丸

懷生地黃 八兩好酒拌砂鍋內蒸半日搗膏

山藥 一兩

桂心 去皮五錢

石棗 淨肉四兩酒蒸搗膏

澤瀉 切片蒸焙乾

白茯苓 去皮各五錢 遼五味子 二兩五錢

牡丹皮 五錢

右為末入二膏加煉蜜少許先如膏乃大瓶裝服六七十粒

○凡人久服加減八味丸必肥健而多子。晚中服此不生癰疽諸毒。不患消渴等症。

○一患癰疽之人雖云有熱。皆因虛而得之。愈後發渴。及先渴而發癰疽。非八味丸不能治。

○一人病癰疽多。有愈後發渴而不救者。治之惟八味丸最效。疽安而渴者服此。則渴止。疽安而未渴者服此。丸則永不生渴。氣血壯盛。或未疽而先發渴者服此。不惟渴止。疽亦不作。

○一人平日口乾作渴。因飲酒食炙。燻補劑。房勞。居若此。類過多致令腎水枯竭。不能上制心火。故有此症。後必有疽發也。宜先服八味丸以絕其源。及癰疽後服此。尤有益也。

○一論癰疽發背諸瘡。出膿潰爛。日久不愈。飲食少思。身體倦怠。口舌乾燥。或寒熱往來。驚悸少睡。以補中益氣湯去柴胡。加蒼朮。麥門。神曲。五味。黃柏。少睡加炒酸棗仁。瘡肉生過加白薇。下錢肉。桂五分。如膿多或

清倍加參芪歸木

一加味十全大補湯治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不識時令錯用則長之可也或見腫平煩冤遂以為安漫不知有無補接調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣

## 附骨疽

丹溪曰附骨疽者皆因久得厚味及勞役與酒後凉水得此陽滯於陰之証也又曰環跳穴痛不止生附骨疽以蒼朮為君佐以黃柏之辛行以毒皮冬加桂枝夏加條芩諸虛者加杜仲牛膝以生甘草為佐作木料煎入薑汁食前飲之痛甚者起前藥十數劑發不動少加麻黃二劑又不動者恐疽將成急掘地坑以灰煨坑通紅沃以小便令患者亦能坐于坑中以席或綿衣圍抱下體使熱氣熏蒸然藥理則酒後忌食

○一論癰生腿外側或因寒濕行阻貫於足少陽經分筋傷足陽明經  
堅破慢腫行步作痛或不能行

內托黃芪湯

柴胡 連翹 肉桂 大力子 黃芪

當歸尾 黃栢 升麻 白芷 甘草各八分

右剉一剉水酒各一盞煎至一盞食前溫服

○一治附骨疽

黃連消毒飲

黃連 羌活各一錢 黃芩 黃栢 蒙本

防已 桔梗 歸尾各五分 生地黃 知母

獨活 防風 連翹各四分 黃芪 人參

甘草 陳皮各三分 蘇木 澤瀉各二分

右十九味切作一剉水煎服。下老人年七十因寒濕地氣得附骨疽下

左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分潤六寸長一小尺緊硬  
慢腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨太痛與此藥一服即止  
次日堅軟腫消而愈

○一論頑瘡惡毒年久不愈多有附骨在內先用貝母濃煎湯洗淨刮去  
腐肉用刀撥去附骨或用蜣螂腦子五六箇搗爛敷上其骨即出然後  
用人言五厘研細末入黃銅燈盞內用好醋一小鍾慢火熬乾收地過  
三日即生出銅線來研極細用雞翎蘸藥搽上即痛止水腐肉去淨  
然後用後藥

### 珍珠象牙膏 楚黃賓江傳

珍珠用豆腐研細末用新將珍珠在內兩片合在縛定入水煮三炷

象牙末一錢 天花粉末五分 官粉末一錢 白堊一錢

香油五錢

右共合下處入罐內重湯煮化盛成膏貼患處神效

○一治諸瘡大疼痛不辨肉色漫腫光色名曰附骨瘻又治瘡日久不愈  
酒調服燒灰略存性

二生散

露蜂房

蛇蛻

亂髮洗淨各等分

右三味燒灰存性研末酒調服錢上

# 腎癰

丹溪曰腎癰者腎居小腹之後在下此陰中之陰道也位僻離曰太陽多  
血然氣運不到血亦平來中年後尤慮患此纔有腫痛奈之脉症但見  
虛弱便與滋補血氣可保終吉若無滋補之功其禍多在結癰之後或  
半年以來乃病多致束手慎之慎之

○一論足太陽經中左右尺脉俱緊按之無力尻腎生癰堅硬腫痛大作  
內托羌活湯



羌活

黃柏

酒炒各二錢 防風

藥本

歸尾

各一錢

黃芪

一錢五

蒼朮

米泔浸

連翹

陳皮

甘草

炙各五分

肉桂 三分

右剉一劑酒水同煎至心溫服以衣覆蓋患處使藥力行常不可去衣

腸癰

丹溪曰腸癰當作濕熱積治不風難治

千金謂腸癰安治必殺入其病小腹重強按之則痛小便如漆時時汗出

復惡寒身及甲錯肚腹緊急如腫之狀脉數者微有膿也若大淋數已

有膿脉若遲緊者未有膿甚者腹脹大轉側有水聲或連臍生瘡或腹

自臍出或大便膿血急服蠟麥丸酒下兼進後方

○一論腸癰便毒癰疽初起即消已腫即潰血從大便中出真

千金內消散方見癰疽即加戒真人活命飲

○一論脏内生癰及癰疽惡毒宜

內消沃雪湯

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

麝香

連翹

香白芷

貝母

陳皮

皂角刺

乳香

沒藥

穿山甲

天花粉

金銀花

木香

青皮

甚者加大黃

右剉酒水煎服秘方是世所奇授之如神

○一論腸癰腹痛不安或腹滿不食小便赤婦人產後虛熱多有此疾但  
婦忽間便不服服亦無害視其右關脉花者是也

薏苡仁二兩

牡丹皮一兩半

瓜蒌仁一兩

右剉一兩水煎服○丁友加川芎桃仁

○一婦人腹痛如錐刺每痛至死不敢着手六脉洪數此腸癰毒也

穿山甲

白芷

貝母

殭蠶

大黃

右列一木刺水煎服打下腹血自小便中出即愈後無患宜少不煎炒銼物

○一治腸癰日久潰爛出膿腹內刺痛不可忍者

用鐵打丁尺長三稜針將腸下脰貫針在內將腸腸曲轉輕緩在入囊門內送到痛處方是瘻瘡之處即將腸腸出針尖出刺破其毒膿隨針而出用手重按瘻處膿出盡而愈此仙傳秘法也

囊癰

丹溪曰囊癰者濕熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟在善於調攝耳又有因重濕流入囊腫甚而囊自裂開等凡懸掛水出以銷炭末敷之死以茶蘇葉包裏仰臥養之

○一論癰疽入囊者當治數人悉由濕熱入肝經處治而用兩陰經花

野脫皮脫器尤懸者皆不死。

○丁方用野紫蘇葉面青背紅者是也。焙乾藥末敷之如爛以香油調敷藥脫無皮者外以青荷葉包之其皮自生。

**懸癰**

○一論懸癰此瘡生谷道外腎之間初發甚痛狀如松子四十日赤腫如桃治遲則破而木小使特從此出不可治矣。

**國老湯**

用橫紋大甘草二兩截長三寸許取出山潤中流水一甌不用井水河水以甘草蘸炙末武火慢炙不可急性須用三時久水湯為度將視草中潤透却以無灰酒二碗煮至一甌服半日漸為度

大黃膠

貝母志

白芷

甘草節各等

右為利酒調空心服。○虛弱加當歸丁半。

○一論肝經濕熱主重患瘡或便毒癰疽癰腫或潰爛作痛小便流滯或紫黑瘰癧。

龍膽瀉肝湯

龍膽草

酒拌炒

澤瀉各一錢

車前子炒

木通

生地黄酒洗

當歸尾酒洗

山梔炒

黃芩炒

甘草各五分

右剉水煎空心服

# 瘰癧

瘰癧瘰癧血氣痰熱必起於少陽二經。不守禁忌延及陽明太極食米少之厚鬱氣之積曰風曰熱皆此二端。拓引變換須分虛實。實者易治虛者難處此其屬膽經主決斷有相人且氣多血少婦人見此其月經如斯不

作寒熱者易治。積久轉為潮熱危矣。自非斷然食淡神仙不治也。

○一論瘰癧者。經所謂結核是也。或在耳前後連及頤頰下連缺盆皆為瘰癧。或在胸前及胸之側下連兩腋皆為馬力。半足少陽主之。獨形而小者為結核。續數連結者為瘰癧。形長如鈴者為馬力也。

○一論遠項起核名曰蟠蛇瘰。延及胸前連腋下者名曰瓜藤瘰。左耳根腫核者名曰惠袋瘰。右耳根腫核者名曰蜂窩瘰。

○一論瘰癧馬力生耳前後或項下胸腋間累累如珠者未破已破皆治消毒化堅湯。

當歸一錢

白芍六分

黃芪一錢

玄參六分

天花粉六分

連翹一錢五分

柴胡一錢

黃芩五分

牛蒡子七分

龍膽草四分

升麻七分

桔梗一錢

陳皮八分

羌活七分

薄荷四分

海昆布七分

甘草四分

右剉丁刺生薑前膜。丁方加甘草節知母貝母海藻更佳。

升陽調經丸

升麻八錢

葛根五錢

芍藥三錢

連翹五錢

黃連五錢

黃芩酒炒五錢

生黃芩四錢

黃柏酒炒五錢

桔梗五錢

歸尾三錢

三稜酒炒五錢  
莪術酒炒五錢

草龍膽酒洗五錢  
夏枯草五錢

甘草炙五錢

右藥秤丁半另研為末煉蜜為丸。如棗豆大每服一百二十丸白湯下。

丁半作咀片每服五錢水煎服半月即痊。

○一論久患瘰癧流注以致氣血兩虛懷抱抑鬱飲食少思或四肢患腫

肉色不變或日晡發熱或潰而不斂久不愈者。

益氣養榮湯

黃芪多

人參

白朮夫蘆炒各當歸酒洗

川芎

白芍炒黃

懷生地黃

陳皮

香附

貝母各一錢

柴胡

地骨皮

桔梗

甘草各五分

右剉下劑水煎食遠服○如身痰加橘紅○如脇下刺痛加青皮或木香○如午後有熱或頭微眩加黃柏炒○如膿水清倍不參黃芪當歸○如女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母○如月經不調加牡丹皮當歸○一論瘰癧兼諸癰皆治

抑氣內消散

當歸

川芎

白芍炒

白朮去蘆炒

青皮去穰

白芷

半夏姜炒

陳皮

桔梗

羌活

獨活

厚朴姜炒

防風

黃芩

烏藥

香附

檳榔各一兩

蘇子一兩五錢沉香三錢

木香

人參

粉草各五錢



右剉水煎服。十餘服即消。若再發照分兩製為末酒糊為丸如梧子大每服五十九酒送下。

○一論瘰癧未破在左為癰癧宜

內消調經散 山東李西園傳

升麻 八分

葛根

龍膽草

黃連

桔梗

連翹

黃芩

黃柏

莪朮

三稜

甘草 各五分

當歸尾

白芍 各三分

右剉水煎服。○稍虛加夏枯草。○有痰加天花粉知母各五分。○少傷

加柴胡四分。

○一論在右名馬刀瘡未破宜

柴胡通經湯

柴胡

連翹

歸尾

甘草

黃芩

煎粘子

三稜

桔梗 各二分 諸虛 五分

紅花

右剉丁劑水煎熱服

○一論瘰癧已破者

補中勝毒湯

黃芪一錢

人參三分

甘草五分

當歸

生地黄

熟地黄

白芍各三分陳皮三分

升麻

柴胡各五分

連翹一錢

防風五分

右剉水煎熱服

○一治瘰癧并頸項結核或腫或痛宜夏枯草水煎食後頓服。丁方用夏枯草一捆水煎三次去渣熬成膏貼患處立消。

○一治瘰癧元氣無虧用此以去之若瘰癧既去而不收斂服前益氣養榮湯若元氣怯弱宜先補後服瘰癧已後仍服煎湯庶無他疾此方治瘰癧未成者消已潰者斂須元氣壯者可服。

必效散

南礪砂二錢半 輕粉一錢

射香五分

巴豆五箇去皮心膜

白檳榔一箇

斑貓四十枚去頭足翅糯米炒熟去米

右研極細末取雞子二箇去黃用清調藥仍入壳內以濕紙敷重糊口入飯甑蒸熟取出曬乾爲末每服五分用炒生薑酒五更初調服如覺小腹痛用益元散下服其毒俱從大便出

○一治遠年鼠癰瘡神方

千槌綠雲膏

松香

半斤落七次瀝去渣

乳香二錢半

沒藥一錢半

血竭一錢

銅綠一錢半

杏仁

去皮一錢孩兒茶三分

草麻子

錢半

麻油二兩

乳汁二盞

右爲細末合作一處同乳汁油攪勻槌搗干下成膏用絹上藥貼患處○一婦人患癰癰久而不愈或以爲木旺之症不宜於春預用散腫消癰湯腫硬斂其氣以爲肝經虧損用六味丸補中益氣湯至春而愈此症

若肝經風火自病元氣無虧可用散聚瀉毒之劑若肝自虧損者不可  
生木用六味丸若金來剋木須補脾土生腎水若行攻伐則脾胃傷而  
反致木剋土矣

○丁婦人項移腫初察其氣血虛實先以必効散下服去之更以養氣養  
榮湯三十餘劑補之而消蓋此症初起而血氣虛弱者先用養氣養榮  
湯待其氣血稍充乃用必効散以去其毒仍用補藥無不奏効若已成  
膿者即針而補托之氣血復而核不消者服散聚之劑尚不應而血  
如故仍以必効散養榮湯又不應者加大黃湯二大用干建線常服自  
愈若氣血壯實不用追蝕亦能自腐用藥以腐之者便易於拔效耳若  
血虛而用追蝕不惟無益適以取敗凡不慎飲食七情者不治

# 疔瘡

夫疔瘡者由四時迭更陰陽交變此二氣互相繫結必成毒氣然其氣在

然大風木鬱木寒大熱若不能避而遇於皮膚入於骨髓傳注經絡  
遂使腠理結滯陰陽二氣不得宣通遂成疔毒但疔毒之名有十二種  
必發於手足間生黃泡其中或紫色有一帶紅線道直入者用針於線  
處刺去毒血水針時以針痛出血為妙否則紅線入腹攻心必致危困  
凡治疔毒先以麝香水飲之吐則是不吐則非也太抵脉洪而數者難  
愈也

○一治疔瘡惡毒神效  
飛龍奪命丹 方見諸瘡

○一治疔腫及無名瘡毒拍頭去白水以葱蜜搗貼神效

○一論無名腫毒疔瘡手指無故生蛇頭指腫痛不可忍有紅筋入心者

蜈蚣二條

歸尾二錢

雄黃一錢

土赤芍二錢

白芷稍二錢

右剉為末頭生酒罨服神效

○一論一切惡毒疔瘡諸般無名腫毒及四時傷風傷寒增寒壯熱無不

初覺者

趙府小靈丹

乳香

沒藥

輕粉

血竭

朱砂

川烏尖

草烏尖

細辛

巴豆霜

蟾酥

麝香減半

右為細末糯米糊為丸如黃米大雄黃為衣每服十五丸小兒五丸用葱白三根劈開入丸在內細嚼好酒送下以被蓋出汗避風婦人孕不可服

○一論一切疔瘡惡毒腫痛神效

類聖散

川烏

草烏

蒼朮

細辛

白芷

薄荷

防風

甘草各五錢

右爲細末雞清調塗患處留頂

○一凡患疔癰疽痛毒此藥能令內消去毒化爲黑水從小便出無  
丁失不可輕視

知母

貝母

白芨

半夏

天花粉

皂角刺

金銀花

穿山甲炒

乳香各一錢

右剉丁剉用無灰酒丁碗煎至半碗去渣只作一服溫服不得加減再  
將渣搗爛加秋過芙蓉葉丁兩搗爛用蜜調并花水和敷瘡口上如乾  
再用蜜水潤濕過丁宿自然消不必用第二服藥也忌發物

○一人脚面生疔形雖如粟其毒甚大宜峻利之藥攻之因其怯弱以隔  
蒜灸五十餘壯痒遂止再灸片時乃知痛更用膏藥封貼再以人參散  
毒散漸愈夫至陰之下道遠位僻且怯弱之人用峻利之劑則藥力未  
到胃氣先傷虛虛之禍有所不免不如灸之爲宜

便毒

便毒一名踏馬癰。此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經多血又名血疔或先有疳瘡而發或卒然起移將痛而發皆熱鬱血聚而成也。初發宜疎利之即散或膿後如常川托裏肉補之藥。

○一論便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發用射干三寸以生薑煎食前服得利二三行立効射干開紫花者是。

○一論便毒極効方  
追毒散

當歸尾

赤芍

白芷

金銀花

天花粉各一錢 白姜蚕炒六枚 木鼈子十箇

川山甲三片

大黃三錢

芒硝二錢

丁方加五靈脂更妙



右剉下剉好酒煎露一宿五更熱服厚蓋發汗利一二行即愈其硝黃待群藥煎將熟方入再二沸用之。○下方加射干去華硝

○一論魚口便毒方

神異散

金銀花

天花粉

木鼈子各二錢甘草三分

連翹

黃芩各八分

山梔子七分

川山甲炒二錢

皂角刺三錢

木香五分

大黃三錢

右剉下剉酒煎水煎空心服

○一治便毒腫痛神方 徐完愚傳

大黃

全蝎

蟬退

姜炭

穿山甲炒炒成白芷稍

貝母

當歸尾各二錢

右合下帖水煎後加入大黃再煎下沸去渣入好生酒同煎服  
如穿山甲條同煎服

○一治魚口瘡方

用猪膽一枚投熱酒一碗溫服即肉消

○一治魚口便毒方

木鱉子

去壳三

巴豆

去壳火燒

川山甲

四片

炒

姜茶

三箇

五倍子

五箇

右為末黃酒調下

○一治魚口便毒方

陳雲岳傳

姜茶

炒三十六

川山甲

土炒

蜈蚣

二條

甘草節

一錢

大黃三錢

杏仁

去皮尖一錢

五靈脂

二錢

全蠍

一個

皂角子

炒一錢

金銀花

一錢

右剉丁剉酒水各半煎服

下疳

下疳瘡乃男子玉莖生瘡皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸淫  
成瘡瘡日久不愈或成便毒或損爛陽物多致危篤又魚口瘡妬精瘡  
皆其類也俗云疳瘡未已便毒復來生也

妬精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交接麝熱黃氣即成此疾初發  
在陰頭如粟類拂之痛甚兩山山清膿作口孔蝕之大痛婦人有生於  
玉門內正似疳蝕瘡不痛為異耳

消疳敗毒散專治下疳瘡

防風 六分

獨活 六分

柴胡 一錢五分

連翹 七分

荊芥 七分

黃柏 八分

知母 七分

黃連 七分

赤芍 九分

蒼朮 七分

赤茯苓 九分

木通 九分

龍膽草 九分

甘草 三分

右剉下剉燈心二十四寸水煎空心服如有便毒量入虛實加大黃一

二錢煎服

○一治下疳瘡

天靈蓋

紅褐

小紅藥各燒存性各等分

右為極細末先用好細茶煎濃洗淨搽之

○一治下疳痛不可忍如神

官粉

水片二分

水銀三分用錫三分製

右為細末搽瘡上

○一治下疳潰爛

珍珠

片腦各一分

人手指甲

足指甲燒成灰各二

血餘燒成灰各等分

右為細末搽瘡處

○一治下疳方

皮硝

乳香

雄黃

孩兒茶各五分

右入小鍋內外用牛糞火煨熟其硝自化藥之晚上使以心口涼

○一治陰頭上疔瘡 何和宇傳

五倍子

燒灰存性 七錢

朱砂 七分

孩兒茶

五分

冰片 半分

輕粉 二分五厘

水銀 一分

右共爲細末撒患處

○如從一邊爛起加狗骨燒灰二分○如從週圍

爛起加鹽煨燒灰二分

○一治疔瘡秘方

八寶丹

乳香

沒藥

孩兒茶

紅褐子灰

海巴焙一箇

珍珠炒

象牙眼

龍骨 煨各五分

右爲細末先用米泔水洗瘡拭乾摻上神效

○一疔瘡膿潰不結痂不合口久不愈者用

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈

○一治下疳瘡瘰癧

陳鍾岳傳

水片二分

珍珠另研三目

蘆薈一分

輕粉炒三分

黃柏以猪胆浸上火炙至三分  
天靈蓋火煨白色一分

右共研細末，搽患處，如有脫香油調搽。

○一治疳瘡

黃柏去皮，以猪膽炙透，為末，搽瘡上。

○一治陰囊上生瘡

用甘草煎水，濕洗，却用麻茶末敷之。

○一治陰頭生瘡

用溪港中螺蛳，入乾鍋內，煨過，先以鹽水洗五七次，後以此藥敷之。

○一治妬精瘡

用木由螺蛳筒，枳殼，煨過，存性，為末，入輕粉，敷之。

○一治外腎生瘡

用藁豆粉，丁分，蚯蚓尿，二分，水研塗，乾又敷。

○一治腎臟風發瘡疥

用紅椒去目水浸半日加生杏仁研爛擦兩手掌擦外腎極效

○一治下部生濕癢癢痛而腫熱太小便澀食亦減身面微腫

馬齒莧四兩研爛入青黛二兩再研勻敷上

○一治下疳瘡

白礬一兩 黃丹八錢熬飛紫色

右研為細末以滌渠中惡水洗過拭乾敷上

○一治蛇蝎發神方

鎮乳石二分 朱砂三分 珍珠三分 琥珀一分五厘

片腦一分五厘

右為細末每用土茯苓四兩猪蹄一隻煎水三碗早間服二碗朝前藥末四厘午間服二碗調前藥末四厘晚間服二碗調藥末四厘午日服三次共下分二厘十日服盡其瘡必愈其猪蹄隨用之忌動風發物牛

肉燒酒最忌之神良之秘方也

# 楊梅瘡

夫腐瘡者一名楊梅瘡因形相似乃氣受之故堅實凸起又名綿花瘡血受之其形扁塌而潰又名果子瘡亦類其像而俗呼之也北人曰天泡瘡皆一名異而實同源治療當別自致者重傳染者輕蓋自致者必因淫慾太妄以至陰虛起火及縱口次味三焦自熱精竭血結遺滯諸經而成者也俗傳以母猪犬羊肉雞鯉毒物發出謂毒盡殊不知在火上添油矣又有怕露出而求速効者過服敗毒散則傷五內傷氣毒入骨髓伏以藥綿薰腫致使出不得出收不能收延遺不得杜絕手足心皮枯似白鵝掌風及後筋骨疼痛風塊惡候皆未獲良治而然也凡遇此患北裏解毒湯外用千里光明湯煎頭洗浴大効

北裏解毒湯



當歸一錢五分 川芎一錢 赤芍一錢五分 生地黃一錢

連翹一錢 黃芩一錢 黃連一錢 酒炒防風一錢

荆芥穗七分 苦參酒炒二錢 羌活一錢 薏苡仁二錢

皂角子二十一分 防已一錢 木瓜五分 生甘草三分

土茯苓二兩 溫者四兩

右對水二碗煎一碗溫服查再煎服○虛弱人加入參一錢○自生者

加黃柏一錢 川牛膝一錢 川獨活一錢 宜服二十帖 每帖煎三次 下

服一帖

千里光明湯

青木香 黃連 黃柏 防風

荆芥 蒼耳子 蛇床子 羌活

升麻 麻黃 甘草各五錢 雞腸草倍 寒青葉倍

右作一劑用布包水煎於無風處服下煎藥即以此湯浴洗愈了又加

熱藥湯洗淨着實洗微汙拭乾十日後不必頻洗此藥法并入前藥中  
再洗雞腸草一名千里光明草又名九里明俗名藤華草其葉稍大而  
歧開花白色處處有之

○一治楊梅瘡初起先服防風通聖散十餘劑後服此散功永無發應  
十全丹 雲來弟驗

雄黃

朱砂

乳香

沒藥

孩兒茶

當歸

白芷

丁香

槐角各一錢

輕粉用花紋一錢煎水調蒸八分

右為細末飯為丸如豆大每服三十丸土茯苓湯下

○一治楊梅瘡先服防風通聖散加蒼朮二兩同煎服後服此

白醇皮二兩

皂角子

十個

防風二兩

細辛一兩三錢

川烏二兩

草烏二兩

鹽菜殼四兩

右剉十劑每十劑用土茯苓一斤豬肉半斤同煎服

○一治楊梅瘡 黃左川傳

連翹 四兩

金銀花 四兩

牙皂 二兩

杏仁 二十一箇

蟬退 二十一箇

肥珠子 三十箇 冷飯團 一片

右俱劉用酒拌炒作土帖水煎服

○一治楊梅瘡毒 黃仰溪傳

青藤 二兩

當歸尾 二兩

皂角刺 二兩

金銀花 一兩五錢

五加皮 一兩

白鮮皮 二兩

右劉分作十二劑每劑用土茯苓四兩水煎服先服通聖散

○一治楊梅瘡 南塘徑驗

漢防已 七錢

槐花 二錢

五倍子 四錢

右三味爲末用土茯苓半斤研爛細肉半斤切碎共作二服用酒煮服連渣并肉連服

○一治楊梅瘡良方

胡靈孫傳

歸尾一兩三錢 牛膝一兩三錢 黃芩一兩三錢 大黃一兩三錢

水叭一兩 金銀花一兩三錢 皂角刺八錢 蝦退五錢

土茯苓二斤

右剉分作十帖每帖用紅棗白果皂角子各十枚煮白三滾水煎服服忌葷豆

○一治天泡瘡神方

用鐵秀紅鐵醋磨濃擦瘡上立已

○一論凡人患楊梅天泡棉花等瘡致成一切難狀之疾或楊梅瘡癰疽骨經手不接口者或筋骨疼痛根發無膿或遍身疙瘡不消或手足破出血或瘡身起皮發癢如丁癩起丁癩或赤白癩癰瘡風癰或皮好骨爛口臭難醫及年久膿瘡不愈一切頑瘡惡瘡並皆神效

通仙五寶丹 鍾乳粉三分 大朱砂一分五厘 琥珀一分五厘 水片一分五厘

珍珠一分五厘

右為細末用白飛麩炒三分共一錢二分分作十二帖每下一日下帖用一分用土茯苓一斤水煎十二碗每使晨用等碗和服其十二碗下日俱要吃盡不可別用茶湯下日一服有不盡料而愈者有終劑而愈者如病重未愈須再服下料忌雞鵝魚牛羊發物及房勞

黑虎腎

○一治楊梅風塊作腫作痛及瘡疽惡癰毒一切無名腫毒

草烏四兩

南星二兩

半夏二兩

五倍子

三兩同蜜煎

大黃一兩

黃柏一兩

姜黃一兩

乾生姜

五錢

右各為細末共和勻用葱汁水調成膏貼塊上時常以葱醋酒之類令乾燥其膏下日又取下加些新的復研再貼以消為度

牛油

香油

柏油

黃蠟各一兩

密化待

銀硃一錢五分官粉二錢

射香五分

右為末入內攪勻先將火烘乾令痒抓破擦上藥再烘再擦如神

○一治楊梅瘡不論遠近先服防風通聖散十數劑後服此丸收功神效

輕粉一錢

孩兒茶一錢

糯米飯一錢

芝麻一錢

右北梅丸作一百箇每早茶清下十九粒並搗要瘡

○一治楊梅瘡

雄黃二錢五分真輕粉一錢

杏仁去皮尖三十箇

右研為細末入杏仁再研加泥用雄豬膽汁調搽瘡要洗淨拭乾

藥二十日效

# 疥瘡

夫疥與癬因熱客於皮膚之所致風毒滯滯為疥也毒之深沉癬也也  
也多因風毒夾熱得之疥瘡於手足或至遍身癬則肌肉癢疹或則

一論風癰疥癬瘡紫白癩風赤游風血風據諸丹類及破傷風在上  
部者加桔梗二錢在下部者加木瓜牛膝各一錢如濕氣成腫而在下  
者去蠅退姜香

祛風敗毒散

枳殼

赤芍

前胡

柴胡各五分 荆芥

薄荷

牛蒡子

蒼木各六分獨活

姜蚕

連翹各七分  
川芎

羌活各八分 蠲退

甘草各三分

右剉一剉牛蒡三片水煎服。

一、葉芥如掃

銀珠錢

雄黃一錢

木鼈子一箇好攪香二 蘇艾葉三錢

右五末爲末。以紙捲條。陰乾。入瓦甕。以鹽漬之。留頭。勿使乾。

以布包裹二便

○一薰瘡疥蟲瘡

花椒

雄黃

斷艾

右三味共為末，將帛捲筒，放被內薰之。

○一洗疥如玉

防風

荆芥

馬鞭草

白礬

花椒

苦參

野菊花

右剉水煎湯洗神效

○一治疥如神

徐金坡傳

大風子五錢

水銀渣三錢

樟腦一錢五分

右用油核桃同搗爛，絹帛包擦疥上。

○一薰疥外方

油核桃去殼，丁半留，丁半搗爛，入全梨，公厘攪勻，仍食下，處放元。



上火燒爛藥之即已

○一治諸瘡疥癩下掃光又名玉編毯

大楓子肉四十九箇

杏仁泡去皮四十九箇二味同研

花椒去目四十九箇另研

白礬生用另研二錢

水銀三錢

茶葉另研末一錢

樟腦二錢另研以上三味同研

輕粉一錢

右和勻再研聽用先以槐柳桃楮桑五木枝煎湯洗疥拭乾將煎藥並  
疥多少用和油入並少許滾熱和藥擦上日搽三次忌羊雞魚猪頭  
等毒物

○一治乾疥瘡

香油四兩用花椒二兩熬至焦黑研爛入大楓子去殼七箇輕粉二  
錢硫黃一錢分三分為末入油內搽之

十香膏

白礬枯

輕粉

水銀

雄黃

川椒

去目炒研

樟腦各一錢

檳榔

一箇研末

杏仁

四十九箇去皮男

大楓子

取白肉四十箇另研

右共

和勻

用柏油八錢

俱入乳鉢內

研至

不見水銀星

為度

在如

子

大待瘡

播破

將藥

凡于患處

滾過

○

一治遍身風痒生瘡疥

土蒸梨

苗煎湯洗之

○

一治老人生皮風疥瘡癢痒

藜蘆根

為末

脂油調搽即愈

○

一鼻聞香疥藥

後山李懷德傳

大楓子

三十箇去壳

朝臘

三錢研極勻

再入

水銀

丁錢研至

不見水銀星

為度

後入

油核桃仁

十箇

右共

下處再研用

金碗盛在內

用紙蓋口

勿令泄氣

用研搽于患處

鼻聞數日即已。或搽亦可。

# 癬瘡

○一風濕癰疽瘡癩血風諸瘡腫毒。

歸尾一錢五分赤芍

黃芩

黃連

黃柏各一錢大黃三錢

防風八分

木鼈子去壳一箇

金銀花

苦參各二錢

右剉丁剉水煎露丁夜五更服。○若腸風漏下血去木鼈子加槐花

丁錢

○一治丁切癰瘡癰疽諸毒。

胡粉另研

雄黃另研

硫黃另研各一錢五分

大草烏三錢生用

斑蝥一錢

砒霜五分

全蝎稍三錢

麝香三分

右為細末。先用羊蹄根蘸醃擦動次用藥少許擦患處。

○一治乾癬不瘥

天南星

草烏 各一箇 生用

右為末。用羊蹄根搗絞汁調塗。

○一治遍身頑癬

大楓子

四十九 川槿皮 一兩

斑蝥

去翅足 五川椒 一錢

輕粉 二錢

杏仁 三錢

海桐皮 二錢

右共為末。河水井水各一碗。浸一夜。蘸汁擦之。

○一治癰瘡効方

萬壽鵲傳

用馬蜂窠一箇。仰放炭火上。用蒜葉末漸漸填滿。下面火炙。令焦。

末。蜂脚醋調塗。癰上即愈。

○下切疥癬癰瘡。及諸瘡不能拔口者。立見收口。

腥腥草

取乾者。末。為土

雄黃 一錢

銀硃 一錢

木鼈子

去壳一箇

艾葉

不拘多少

右為朱梅捲燒烟葉患處立效

○一治疥癬坐板血風痛痒神効 孫方李存吾傳

大楓子去壳四錢 木鼈子去壳二錢 二川椒二錢

枯礬二錢 輕粉一錢 水銀一錢 朝腦一錢

右為朱梅油搗勻先將艾湯洗令淨待痒抓破擦患處大効

○一治牛皮癬極痒抓爛

牛脚水燒灰存性為末香油調搽立効

○一治癬瘡

用銅針結令極緊快痒時於癬上各刺百針血出熱煎鹽湯洗之

未愈再刺再洗

**疥瘡**

自癢之候頭上白點斑初似癬而上有白皮膚久則生如麻成瘡之至

偏頭洗刮除其流頭皮瘡孔如筋頭大裏有膿汁出不痛而有微痒時其裏有蟲甚細微難見九蟲論亦云是蟻蟲動作而成此瘡乃至自小便其大不痒頭髮悉落故謂之白禿也宜以後方而治之

○一治瘡瘡方

藜蘆二錢

枯礬二錢

苦參二錢

五倍子二錢

右爲細末香油調搽

○一治香瘡方

臨穎楊子登傳

仙人垢即埋菰道人棺板店上垢膜也所爛不拘多少

右用鯽魚以香油煎熟去魚將油調仙人垢塗禿上一二錢厚工一次食

○一治禿落

先用水洗令淨用燒酒和芥末調塗禿處立已

○一治禿落

膽礬二錢

乳香二錢

沒藥二錢

明礬五錢

食鹽三錢

木柏油一兩

右同草並煎久下前三味剉充方搽

○一治瘰癧如神 雲松第驗

紫草三錢

木柏油一兩

膽礬一錢

沒藥二錢

石乳二錢

樟腦二錢

淮鹽炒三錢

右爲細末和油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨擦藥下日搽下次神效

○一治小兒白禿瘡

黃柏皮五錢

枯礬一錢五分

硫黃

輕粉各一錢

右爲細末臘月猪油調日擦三次又用太極膏貼患處

○一治禿頭瘡

用細魚鱗重三四兩去腸肚以亂髮填滿紙裹燒存性燂黃二錢共爲末清油調敷先以鹽洗拭後用藥

又方以苦練皮燒灰用諸脂調敷

# 癩風

紫癩風白癩風乃因心苦汗出及醉飽並浴後毛竅開時乘風按扇得之  
扇風侵逆皮膚所致宜服胡麻散或追風丸外以洗擦藥油之  
○一論紫白癩風并癰及面上酒瘡又名粉瘡面刺俱可服之

## 胡麻散

胡麻子 赤色扁者佳。另研五兩。

白芷二兩

何首烏 二兩

防風 二兩

蔓荊子 一兩五錢

甘菊花 一兩

苦參 酒炒三兩

威靈仙 二兩

升麻 二兩

川當歸 二兩

小芍藥 二兩

牛蒡子

微炒二兩另白炭燻三兩

荆芥穗 三兩

薄荷葉 二兩

片黃芩 酒炒二兩

黃連 酒拌一日炒二兩



白芍 酒炒二兩

右爲細末。每服三錢。食遠服。秋分後至春分。白酒調服。春分後至秋分。茶清調服。用米糊細丸。食遠白湯下亦可。

○一治白癩風

追風丸

何首烏 四兩

荆芥穗 四兩

蒼朮

米泔浸

過

苦參

四兩

右爲細末。好肥皂三斤。去皮弦子。入砂鍋內。水熬成膏。和爲丸。如梧子大。每服五六十丸。空心溫酒或茶任下。忌一切動風之物。

○一治白癩風

用雄雞腎白果仁搗爛。擦患處。

○一治汗斑方

白蓮花

半夏

右各等分。爲末。飛麝香爲丸。如彈子大。用陸芽茶擦之。

○一治紫癰風白癰風即如今汗斑之類

白附子

雄黃

密陀僧

右各等分爲細末用帶皮生薑自然汁調以茄蒿葉擦之即愈

○一治紫白癰風神方

雄黃二錢

雌黃二錢

硫黃二錢

白砒二錢

白礬二錢並用透明者佳

右共爲末每用時先一浴令遍身出汗次以搗生薑拌藥布包患處擦之良久以熱湯淋洗

○一治白癰風方

用杜蘅葉子生搗爲末作湯服之每服三錢

# 癰風

夫癰風者天地殺物之風燥金之氣也故其病而不腫燥而不濕燥金之

體盛故一客千人則榮衛之行滯矣人不仁而麻木也毛落眉脫者燥風伐其榮衛而表氣不同也遍身癩疹者上氣下血俱病也諸痛屬諸痒屬虛癩風之痒固多有蟲而衛之虛不可証也是証也主燥則以主之白花蛇血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然而潤乎然其性中有毒同氣相求直達癩風毒舍之處豈不居然而效乎身用之性善於滋身則亦可以滋病苦參之性善於去熱則亦可以去風昔人在以防風通聖散此方乃汗下之劑也非榮衛虛弱者所宜今以玉屏風散更之則黃芪可以排膿補長防風可以利氣疎邪白朮可以實脾而補肌矣

補氣瀉榮湯

- |      |        |      |       |
|------|--------|------|-------|
| 黃芪三分 | 人參二分   | 當歸三分 | 生地黃四分 |
| 黃連三分 | 黃芩四分   | 連翹六分 | 升麻六分  |
| 桔梗五分 | 甘草一錢五分 | 全蝎三分 | 地龍三分  |

桃仁二箇

蘇木三分

胡桐淚一分

蜜蠟一枚去翅足殺

水蛭三枚炒盡射香少許

右剉一劑水煎溫服

○一論治癰風手足麻木毛落眉脫遍身癩疹搔痒成瘡等症。

愈風換肌丹

白花蛇

一條頭尾全者酒浸二三日去骨陰乾

苦參四兩

皂角

五斤去皮弦酒浸下宿取出以水熬膏

右爲末以皂角膏和丸如梧子大每服七十九以防風通聖散送下。

苦參酒

用苦參五斤好酒三斗漬一月每服下合日三服。

苦參丸

苦參一斤

金銀花

防風

荆芥

羌活

獨活

當歸

川芎

赤芍

連翹

黃連

黃芩

梔子

滑石

白朮

甘草各一兩

右為末，麝香為丸，如梧子大，每服百丸，黃參酒下。

○一治癰疽

如聖丹

全蝎

五錢

一兩

天麻

一兩

五錢

僵蠶

炒一兩

蟬退

一兩

苦參

一兩

防風

一兩

五錢

荆芥

一兩

羌活

一兩

細辛

一兩

白芷

一兩

川芎

一兩

當歸

一兩

白芍

一兩

人參

五錢

白朮

去蘆一兩

枳殼

去穰一兩

桔梗

一兩

黃連

五錢

黃柏

去皮一兩

大黃

煨一兩

芒硝

五錢

麻黃

一兩

石膏

煨一兩

滑石

一兩

皂角刺

一兩

鬱金

五錢

山梔子

一兩

連翹

一兩

大楓子

去壳一兩

獨活

五錢

石三十味為細末。用紅米糊為丸。如梧子大。每服五七十丸。用六安茶清送下。日三服。半身全愈。小便尿如靛水黑色。此病之深者。只用此藥二料。如眉毛鬚髮脫落。日漸生長。切不可食羊肉鵝雞豬頭蹄鯉魚生冷。如肯食。後百日全愈。如瘡破裂。只用大楓子壳煎湯洗。春夏石膏貼石松方。秋冬二味減半。過春分秋分服。防風通聖散一帖。空心服。利三四次。以粥補之。方見中良。

○一治偏風眉髮脫落者

取皂角刺九蒸九晒為末。每服二錢溫酒送下。久服眉髮再生。肌膚脫潤。眼自倍明。

○一治木風惡疾。雙目昏暗。眉髮自落。鼻梁崩倒。肌膚瘡爛。此方特効。

皂莢刺三斤。灰火蒸炙。晒乾為末。煎大黃濃湯調服。數日間髮生。肌膚目明。諸病立瘥。

○一治太麻風。即太風落。



○一論腺腿生瘡或癰疥等症  
四生散

白附子

黃芪

羌活

沙苑蒺藜

右各等分爲末每服二錢用猪腰子批開入藥濕紙裹包煨熟細嚼湯下風癰酒下

○一論腋瘡乃濕毒所致及治遍熱瘡

黃白散

黃柏去皮一兩輕粉三錢

右爲細末用猪膽汁調塗濕則乾搽

○一論遠年近日一切瘰癧潰爛疔瘡疼痛當時止痛生肌如神

三香膏

乳香二錢

松香三錢

右爲細末真生香油調用包瘰癧瘡者密針刺孔將藥攤其上



并葉貼患處藥膏中上用完新葉蓋藥上用紙扎住即效

○一方用松香為末入落根藥等分同搗為餅外用石乳香為末少摻

藥餅上搭在瘡口布帛緊扎二百一換鹽茶洗淨

○一治膿瘡方

密陀僧八錢 石乳二錢 血竭一錢 銅青八分

右為末將油帶刺孔相油搗帶上搽藥在油上隔帶貼之效

○一治膿瘡頑瘡諸瘡許敬吾傳

柏油二兩 黃蠟三錢 白蠟三錢 香油三錢

密陀僧一兩五錢為末

右將上四味入盆碗內火上煎化頻入陀僧在內攪不住平成餅為

度將油帶刺孔上藥油帶反摻以孔在下貼瘡

○一治兩足生膿諸瘡久不已後山李懷敬傳

輕粉一錢 官粉二錢

右用猪板油同搗爛開油紙上貼瘡外最包緊一日換一次先用煎茶洗淨貼藥

○一治腫瘡爛脚方

先用米泔水洗淨再用川椒艾葉濃煎水洗淨用黃丹不拘多少煮香油調搽碗裏以艾燒烟薰至黃色上紙隔紙貼之妙

諸瘡

○一專治疔瘡發背腦疽乳癰疽附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭不痛者服之便痛已成者服之立愈此乃惡症藥中至寶病危者立可復甦萬無一失乃家傳之秘方不可輕視竊之者其罪大矣

飛龍奪命丹

雄黃三錢

血竭一錢

朱砂二錢為末

乳香二錢

輕粉五分

沒藥二錢

銅綠二錢

膽礬一錢

寒水石一錢

蜈蚣一條酒浸炙黃去頭足 蝟牛二十一箇

麝香五分

蟾酥二錢乾者好酒化

右為細末先將蝟牛連壳搗爛和前藥為丸如棗豆大如丸不就入酒打麝粉為丸朱砂為衣每服二丸先用葱白三寸令病人嚼爛吐於男左女右手心將藥丸聚於葱白內用無灰熱酒送下於避風處以衣蓋護之約行人五七里之久再飲熱酒數杯以助藥力發汗汗度病初發二丸即消如汗不出再服二丸汗出即効三五日病重者再服二丸即愈如疥瘡走黃過心者雖治之汗出於心者亦難治如病人不能嚥葱搗爛亦可瘡在上食後服瘡在下食前服服藥後忌冷水王瓜茄子猪雞魚肉濕麪下切發風發瘡之物數方校正無差

○下切百瘡無毒兼治痔漏

清毒百瘡丸 單水雲傳

錦紋大黃

一斤切片聽用

蒼朮

黃柏

當歸

槐花

金銀花

皂角 各四兩

右將六味細切水二十碗煎至十碗去渣浸大黃令透取出晒乾又浸又晒以汁盡為度為末麵糊為丸如菉豆大每服不十四丸白湯送下以未便下滯物為效

○一切無名腫毒瘡癤疽乳硬等症初發時即將

真香油一杯溫熱飲之則毒不攻心可以緩治

○一切無名腫毒瘡癤

須臾腫起痛難當

急將妙藥頻敷貼

免使猖狂作禍殃

○一治無名腫毒瘡癤疽疔瘡等毒

白礬不拘多少為末入新汲水內用粗布三張浸內將一張搭患處

頻貼之更貼十數次立消

○一方用葱頭并爛炒熟取出冷則易之

丁方用木黃蘗末醋調塗疔處。

○一切無名腫毒初起

牙皂七箇燒存性爲末入真蛤粉炒過七錢攪勻用生酒調服。

○一敷諸瘡腫未破者。

蝦蟇丁箇先以石灰炒過後將蝦蟇剝爛同研如泥用絹帛攤干貼患處自破

○一治諸瘡惡毒。臙瘡疥癩。搭手背疽等症。

葱白一片

馬蘭兒  
一片

石灰 一斤

右三味攪搗爲餅陰乾爲細末貼瘻卽効

○外消腫毒方

猪苦胆三箇

生薑

半斤取自然汁好醋一盞

右三味合和于處以好京墨磨濃抹腫處立消

○一治外科諸毒腫痛初起未破

用通慈數根用稻稈燒過半熟搗爛入蜜二匙再搗勻成餅敷患處立消肉服白礬熔化為丸朱砂為衣每服三錢用葱酒送下汗出立已

○一治無名腫毒

用家園生地黄搗爛敷之立已

○一切無名腫毒瘡癤

樹上馬蜂窩二箇

壁錢扯破一錢

乳香

沒藥

孩兒茶各八分

雞膜皮一錢

右各為末朱砂細扯破丁錢攪香三根共鋪細布上捲作筒線細蘸入香油點着照患處如腫盛加艾少許

○一治諸般惡毒腫痛不可忍者 廣白知縣刊行于世活人多矣  
一枝箭

白芨

天花粉

知母

牙皂

乳香

金銀花

半夏

穿山甲 酥炙 貝母 各一錢五分

右剉丁刺酒二鍾煎下鍾溫服汗出即愈

○丁切瘡毒腫痛成膿未成膿用火確頒三次即將膿水拔出而消散矣  
洪寶骨

天花粉 三兩

赤芍 二兩

白芷 一兩

姜黃 一兩

右爲細末茶調敷之此藥下涼而已能化血爲水涼肌生肉去死肌爛肉及能破血退腫又能止痛出膿或用三分姜汁七分雞清調敷能使血退姜性熱能引血潮故血破散而後成膿如熱盛瘡毒恐隨乾隨痛赤腫不退者用雞清調敷取其雞乾如湯火燒療亦同也  
○一敷治一切腫毒瘰癧如神

鐵箍散

南星

草烏

白芨

白礬

白微

黃柏

天花粉

吳茱萸

白芷

各一兩 芙蓉葉二兩

右為末雞清調敷

○一治血風瘡并濕熱生癰其形如釘高起寸許者  
追風解毒湯

通翹

黃連

黃芩

黃柏

防風

荊芥

羌活

獨活

全蝎

姜蚕

蒺藜

金銀花

威靈仙

歸尾

赤芍

甘草

右剉各等分水煎服。

○一治血風疥癬蟲瘡癩瘡痛痒發熱等症。徐完初試驗。

大楓子

去壳

樟腦

五錢

水銀

二錢

輕粉

一錢



核桃肉十箇

右共研爛爲丸如彈子大放手掌心揉擦其瘡自已連擦四五次以愈爲度或將藥擦瘡上亦可

○一治軟瘡癰毒久不能開口腫痛不可忍者

巴豆用簪穿燈上燒存性爲末放瘡頂上以膏藥貼之即潰

○一治坐枝瘡 瑄四九兄傳

花椒一錢炒 胡椒七分

枯礬一錢 人言一分

右爲末和油調搽

○一治坐枝瘡癰痒經年弗愈 中州傳愛泉傳

人言一分 密陀僧三分

硫黃二錢 石膏一錢五分

右爲末生猪油調搽患處

○一諸瘡口難斂及多年惡瘡百方不瘥或痛然走不已者

馬齒莧搗碎口并周圍立効

○一治瘰癧其爛不絕者

雄黃

生白礬

右各等分煎水洗之

○一治濕癩瘡方

黃蠟一錢

白朮一錢

銅綠一錢

黃丹一錢

童女髮一錢

右用香油二兩入鍋內熬入藥同煎時搗碎作十數段入鍋內熬

○一治瘰癧

用茄子根濃煎湯洗并山雀兒腦隨處洗之

○一諸處瘰癧久不瘥年止發不歇先將後痛然後腫破出黃水不止

用雄雞黃一枚搗爛黃蠟各等分清油減半石臼於棧火中炒乾

患處如治脚手瘰癧用櫻桃殼存性研末入輕粉醋調敷之

○一治頭上風瘡腫痛臭爛

用包銀硃粗並燒爛為末

○一治蛇頭指

用雞子開下竅將指入內待腐化水又換之高如此一夜即落

○一手足患纏爪黃腫痛作膿不可忍

用蒜加石灰搥爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍為不可開

用蜈蚣一條焙乾為末酒服汁調服

○一叉指無名腫毒痛不可忍

白芨末一錢 蟾酥三分

右共研為末處用雞清調陰常時腫消痛止

○一治血風瘡

石膏

硫黃

百草霜

右各等分柏油調搽

○一治脚上諸般瘡毒

黃丹

官粉

松香各一錢

銀硃三分

右為細茶湯洗淨之瘡口

○一治脚上諸般瘡毒

水銀一錢

沒藥五分新瓦焙乾黃丹五錢

細茶三錢

大楓子十箇去壳輕粉一錢

黃蠟五錢

石乳香五分瓦焙片腦三厘

真麻油一盞

右藥俱研極細末篩過用黃蠟麻油同煎用文武火慢煎鎔成膏  
冷方下片腦再煎一刻取出用細嫩油搽薄抹瘡口大小為度不宜太  
潤一日一換每貼用後藥煎水洗瘡口方貼

大黃

苦參

黃柏

蒼朮

防風

金銀花 艾葉 茶葉

右各等分煎湯洗瘡也

○一多年頑瘡久不愈者用諸藥玉散口者

黃蠟二兩 黃丹四兩 輕粉 乳香 沒藥各二錢

血竭 孩兒茶各一錢

右為細末先將真麻油半斤熬熟滴水成珠下黃蠟化開再入黃丹新起離火方下諸藥攪勻久確收用

○一雀斑瘡及似花之狀

胭脂 貝母各三錢 胡粉二錢五分 硼砂

沒藥各二錢

右為細末先用溫漿水洗淨後敷之

○一月蝕瘡蟲或生小耳內

胡粉炒微黃 枯白礬 黃丹煨 黃連

輕粉

明脂各三錢 射香少許

右為末以鹽水洗之拭乾後換藥上月麻油調敷即愈。

○一脚生雞眼作痛者以雞眼膏刺洗效。

○一脚指縫白爛者

用鵝掌黃皮燒存性為末敷之如出水用飛黃丹入荳蔻粉搽之。

○一治脚前腫上二指腫痛頑癬潰爛久不愈。

隔壁膏 陳雲岳傳

枯礬三錢 密陀僧三錢 龍骨煨二錢 黃丹水飛三錢

右用油為將布針刺孔相湘調搗止貼患處。

○一治軟癰方

用牛膠將滾水煎軟中留十孔出氣貼患處久之自落。

○一人累年遍身生瘡疥風癢難禁遂難醫尋製此方服之永不生瘡。

瘡妙不可言。

當歸酒洗二兩

白芍乳汁炒二兩

懷生地黃酒洗二兩

防風去蘆二兩

熟地黃酒蒸二兩

川黃柏鹽水炒一半童便

知母去毛二兩酒炒白木壁土炒一兩

土茯苓六兩

苦參去粗皮四兩甘草一兩

右為細末用猪肚一箇好酒閉壺文武火熬爛搗和藥末為丸如梧子

大每服五十丸酒送下忌雞魚牛羊肉

○一治瘰癧久不愈

黃芪二兩

當歸一兩五錢白芍二兩

白茯苓一兩

白芷三錢

川烏一兩厚朴五錢

厚桂七錢

陳皮一兩

炙甘草二錢

右判姜蜜煎服

膏藥

○一治一切風寒濕氣手足拘攣骨節酸疼男子瘰癧婦人血瘕及腰脇諸般疼痛結核癰癰頑癬頑瘡積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處肚腹疼痛瀉痢瘧疾俱貼臍上兩白而寒尤効咳嗽喘受寒惡心胸膈脹悶面色痿黃心疼氣痛俱貼前心真重傷力渾身痛者貼後心腰眼痛小腸氣等症貼臍下治無不効

神異膏 傳參將方

木香	川芎	牛膝	生地黄	細辛
白芷	秦艽	歸尾	枳殼	獨活
防風	大楓子	羌活	黃芩	南星
草麻子	半夏	蒼朮	貝母	赤芍
杏仁	白欬	茅香	兩頭尖	艾葉
連翹	川烏	甘草節	肉桂	良薑
續斷	威靈仙	荆芥	藥木	丁香



金銀花

丁皮

藿香

紅花

青風藤

烏藥

蘇木

玄參

白蘇皮

姜蚕

草烏

桃仁

五加皮

山梔子

牙皂

苦參

穿山甲

五倍子

降真節

骨碎補

蒼耳頭

蟬退

蜂房

鼈甲

全蝎

麻黃

白芨 各一兩 大黃二兩

蜈蚣 廿一條 蛇退三條

右用桃柳榆槐桑練栢七色樹枝各三七二十下俱切粗片用真麻油十二斤浸藥及三宿春五秋七冬十宿後煎藥枯油黑為度用麻布濾去渣貯磁器內另以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每香二斤用藥油四兩拭水軟硬得法仍濾入水缸中令入扯抽色如黃金即成膏矣。

○一治風寒濕氣所侵跌撲閃挫傷損下切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處哮喘咳嗽貼背心瀉痢貼臍上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無

名腫毒疔疽發背瘡癰濕毒腫瘡疔毒時便貼患處即消已成亦能損  
膿長肉止痛甚効不能盡述。

神祕萬金膏

草烏

川烏

大黃各六錢當歸

赤芍

白芷

連翹

白芨

白蔞

烏藥

官桂

木鼈子各八錢

槐柳桃桑棗各四錢

一方加苦參皂角各五錢

右剉散用真麻油二斤浸藥一宿用火熬至藥焦色以生絲絹濾去渣  
不用將油再入鍋內以文武火熬至滴水成珠不散方下飛過黃丹十  
二兩要炒過陸續下勻滴水成珠不散為度後入乳香沒藥末各四錢  
攪勻聽用。

一方加酥合香二錢一名萬應紫金膏

○一治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈

肉已死而用之自潰新肉易生搽至肉色漸白其毒始盡生肌最速如  
棍杖者外皮不破肉肉糜爛其外皮因肉嫩乾縮堅硬不潰爬連好肉  
作痛故俗云疔痂皮致膿痰無從而泄肉愈脹痛難以潰飲怯弱之人  
多成破傷風症每致不救若杖瘡內有瘀血者即用有鋒芒磁片於患  
處破去塗以此藥則疔痂死肉自潰膿穢自出所潰亦淺生肌之際亦  
不結滯又免皺揭之痛殊有功效

當歸膏

當歸一兩

生地黄一兩

黃蠟一兩

麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去渣入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣蓋當  
歸地黃麻油二蠟主生肌止痛補血續筋與新肉相宜且蠟尤妙

○一治諸瘡腫毒及諸病等症神効

神効萬靈膏 五臺山無窮禪師秘藏方

當歸

川芎

赤芍

生地黄

熟地黄

防風

羌活

獨活

連翹

山梔

黃連

大黃

玄參

苦參

白芷

五倍子

兩頭尖

皂角

桔梗

白芨

白薇

紅牙大戟

山慈菇

天花粉

官桂各六錢

草麻子

八十

木鼈子

四十

杏仁

四十箇

巴豆肉

四十

穿山甲

十片

右剉散用真麻油一斤四兩髮餘四兩入藥浸春秋三日夏二日冬五

日油藥放鐵鍋內文武火熬用槐柳枝長寸許各三十根同熬焦色用

麻布濾去渣再放油鍋內熬滴水成珠不散傾出瓶內秤準油二斤下

山東黃丹一斤松香二兩姜汁煮過黃蜡二兩桐油二兩熬至不老不

嫩冷了下乳香沒藥血竭孩兒茶阿魏百草霜各三錢射香五分或一

錢輕粉三錢馬寶膏三錢俱為細末藥油將好投下早了恐濃藥氣再

熬不粘手為度將膏藥埋土內三四日出火焙磁瓶內收貯隨意攤貼

倘膏嫩加抗粉不拘多少不粘手為度

○貼諸腫毒疔瘡發背治諸病法于後

○一瘡疽發背癰疽瘡毒起一貼將火焙雙手上下摩百餘次出汗爲度如有膿血之瘡貼上膏藥便罷不用手摩

○一疥瘡癬瘡搔癢貼上不用手摩

○一風癩皮膚先用木鼈子火煨熟搗爛放腫上貼之

○一咽喉喘嗽貼膏背焙手摩百次

○一無名腫毒貼患處瘡初起焙手摩出汗諸毒發陰陽男子貼丹田婦人貼血海焙手摩百次

○一打破損刀傷貼患處如虎腫貼腫處焙手摩百次

○一熱嗽冷嗽傷力貼肺俞焙手摩百次

○一風痰壅塞貼心坎痛處焙手摩百次

○一男婦諸瘡塊用麝作圈放瘡上用皮硝二兩錫黃五錢大蒜二顆將爲一處用膏貼瘡上硝黃蒜放圈內以熨斗火熨藥上要透熱煨木

○ 鼈子肉、放膏內、小兒瘡塊、不用硝、煨手摩百次。

○ 一男婦偏正頭風、俱貼太陽穴、煨手摩百次。

○ 一男子遺精、女人白帶、煨木鼈子肉、男貼丹田、女貼血海、煨手摩百次。

○ 一蠱脹、貼心下膈上、煨木鼈子肉、煨手摩百次。

○ 一左癱右瘓、濕氣疼痛、貼患處、煨木鼈子肉、煨手摩百次。

○ 一暗風、貼肺俞穴、并心口下三寸、煨手摩百次。

○ 一月經不調、貼血海、煨手摩百次。

○ 一醉後嘔吐、貼肺俞、心口、煨手摩百次。

○ 一冷氣沖心、痛、貼腹際、痛、依病大小貼、煨手摩百次。

○ 一四時傷寒、貼脊心、煨手摩百次、出汗為度。

已上諸般疼痛、照法貼之、煨手摩百次、其患處即愈。

# 杖瘡

○一杖打玻璃腿腫痛。

金鳳花科一根搗爛如泥敷患處如乾又塗上。一夜血散而愈。

○一杖瘡久不愈者。

雄猪骨髓日夜搽破腫處立已。

○一杖打血侵腦腫痛。

石灰三錢入水攪澄再入香油五錢用金銀腳攪打成膏以雞翎蘸上使血水長流須臾腫消痛止。

○一杖杖之先。

用白蠟細切入碗內滾酒泡服打着不痛。

○一杖瘡方。

用麻油二分水一分黃丹一錢入碗內用銀簪攪成膏用鴨毛刷上外用帛貼日四五次避血正行立時腫消痛止。

○一治杖瘡及遠年近自一均聖瘡。

黃蠟二兩

黃香

二兩為末去黑

香油三兩頓溫

乳香末五分

沒藥末五分

右先將蠟入磁碗內慢火化開用筋敲碗邊續入黃香乳沒取碗離火入溫香油於內攪勻待冷入水缸內去火毒三日取出油單并攤藥貼患處。

○一杖打傷重敗血攻心欲死。

蘇木三錢

紅花三錢

歸尾三錢

大黃二錢

右共為末童便一大鍾煎至一鍾不拘時熱服。

○一杖打後潰爛久不愈者此氣血虛也。

人參

白朮

去蘆炒倍白茯苓去皮

當歸

白芍

陳皮

熟地黃

香附子

貝母

桔梗

甘草各等分

右剉下剉水煎空心服。○往來寒熱加柴胡地骨皮。○口乾加五味子。



麥門冬○臘油加黃芪○臘多加川芎○肌肉遲生加白薇肉桂○  
白龍棒瘡膏 方外異人傳

臘猪油錢一兩七

白蠟

輕粉

定粉各五錢

黃蠟三錢

朝腦二錢五分 乳香一錢

沒藥二錢

冰片一分

右為末先以猪油同二蠟化開入羣藥末調攤貼之○

寄杖神丹

何和宇傳

此藥服後任打無妨且血不後補○

乳香

沒藥各五分

血竭

孩兒茶

三七各一錢

木茸焙乾

白蠟各二錢

辰砂七分

青木香一錢

海螵蛸五分

琥珀三分

天靈蓋火煨三分

右為末沙糖為丸如苦珠大每服三丸好酒送下即打看不甚痛如未

受貴用兩手挺背即消

○一林瘡潰爛生蛆用皂礬煨過為末乾摻其內蛆即死○

# 折傷

夫折撲墮墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮破出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者兼補行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛後調氣養血補益胃氣無不効也

大凡傷損不同壯弱及有無瘀血脣積俱宜服熱藥便以酒佐之推陳致新其功甚大

○一論跌傷骨折用藥一厘黃酒調下如重車行十里之候其骨接之有聲初跌之時整理如舊對性綿衣蓋之勿令見風方服藥休移動端生

日製忌婦人雞犬等物

一厘金 大梁孫都督秘傳神効

土鱉一箇新瓦上焙巴豆一箇去壳

半夏一箇生用

乳香 半分

沒藥 半分

自然銅

大塊者七次用此

右爲細末每服一厘好酒送下不可多用多則補得過起妙不可言  
一被打傷重惡血攻心或木石壓死并跌磕傷從高墜下跌死氣絕不能言語取藥末便急劈開口以熱童便灌之下方用牛麻燒灰調酒服  
一凡跌傷打傷腫痛不可忍者以生葱搗爛熱熨之甚妙  
一傷肢折臂者即將折處轆上綁定用好酒一碗旋熱將雄雞一隻刺血在內橙白乘熱飲之仍將連根葱搗爛炒熱敷上包縛冷再換亦治刀刃傷痛與血隨止

一折傷先用止痛法

白礬爲末每用一匕沸湯一碗化之以酒醱熱敷傷處少時痛止然後排整筋骨貼藥

一治傷損爛痛紅腫屬熱毒者并接斷

濟陰丹

天花粉三兩

薑黃

白芷

赤芍藥各一兩

右為末濃茶調探患處

○一治跌打傷損傷骨先用手扯伸後用小奶雞工隻搗爛搭土外用杉木板夾之次日再搗取効如神

○一論打撲傷損至重大小便不通瘀血不散肚腹膨脹上攻心腹悶亂至死者此藥通下瘀血方可服補損藥大成湯

大黃二錢

芒硝二錢

枳殼二錢

厚朴一錢

當歸一錢

桃仁一錢

蘇木一錢

紅花五分

木通一錢

甘草少許

右剉水煎溫服

○一論從高墜下惡血流於脇下痛不可忍

復元湯

柴胡五錢

當歸六錢

穿山甲

土炒

二桃仁

去皮五十箇

紅花二錢

瓜蒌仁二錢

大黃酒浸一兩

甘草二錢

右剉一兩水一盞酒一盞煎七分溫服以利為度

○一論墮墜挫閃氣血凝滯攻刺腰痛

羌活桃仁湯

羌活

蒼朮

米泔炒

當歸尾

玄胡索

桃仁去皮

紅花

牛膝去蘆

杜仲酒炒

破故紙炒

小茴香酒炒

乳香

官桂

右剉一劑半水半酒煎服

○一治跌撲傷損

真牛膠一兩

乾冬瓜皮一兩

右二味剉碎入鍋內同炒焦枯在性為細末每服五錢好酒一鍾調服後仍飲熱酒二三盞厚蓋得微汗痛即止一宿揉完如不效

○一論跌撲所傷，為數不繁。或人元氣虛寒，腫不消散，或不潰斂，及應癰疽堅硬，不痛，肉色不變，久而不潰，潰而不斂，或筋斷骨節，一切冷症，並治回陽玉龍膏。

草烏二錢炒

南星一兩煨

均薑一兩炮

白芷一兩

赤芍一兩炒

肉桂五錢

右為末，熟湯調，搽熱酒亦可。

接骨止痛神方

楮根皮

茸花枝

又名合歡樹，又名夜合花。

右二味用水一碗煎至七分，加酒一鍾，調入火煎過，去渣，盡一二錢，服，當時痛止。

○一治跌撲傷損

蟹二隻連殼搗爛，好酒一碗煎去渣，服，清數服。

○一治打撲青腫疼痛

用青槐移房水頻搗患處其膏腫立退

○一論打撲跌損傷牙咬刀傷出血諸般腫毒出血後肌肉不生痛不紅止血定痛生肌散

乳香三錢

沒藥三錢

血竭二錢

黃丹飛過五錢

白芷二錢

二錢五分

龍骨

火煨三錢

軟石膏

飛去火兩朝腦少許

右為細末磁器盛每以擦患處血止痛生肌

○一治傷損等症失血過多或因跌打血氣耗損發熱煩燥作渴

八珍湯

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍

熟地黃各一錢甘草炙五分

右剉碎水煎服

○一治被人打傷筋骨跌撲損傷氣血虛弱等症宜

隨病無異方見補益

○一治打撲損傷落馬墜車一切疼痛  
乳香定痛散

乳香

沒藥

川芎

白芷

赤芍 各一兩

生地黄

牡丹皮 各二兩

甘草 五錢

右爲細末每服三錢溫酒并童便調下

○一治風損如神膏 謝醫風傳

用生薑汁葱白汁好醋各一碗下黃丹末半斤同熬又下香油四兩  
再入桐油四兩熬至滴水成珠不散下黃丹一兩再熬成珠入射香  
五分貼風損如神

# 破傷風

夫破傷風者有因奇暴傷損風氣之聞得推經絡致使寒熱更作身體不  
張口禁不開齒者邪氣入臟有因諸瘡不瘡榮衛虛弱肌肉不生瘡服



不令風邪亦能外入於清爲破傷風之候有諸瘡不瘡舉世皆言新文  
爲上。是謂熱瘡而不知火熱客毒透經諸變不可勝數微則發熱甚則  
生風瘡或瘡口反張口噤目斜亦有破傷風不灸而病者因瘡者白痂  
瘡口閉塞氣應於陽故熱易爲鬱結熱甚則生風也古方藥論甚少以  
此病與中風同論故不另立條自惟河間論病同傷寒証治通於表裏  
分別陰陽有在表有在裏有在半表半裏者在表宜汗在裏宜下在表  
裏之間宜和解不可過其治也故表脈浮而無力者太陽也脈長而有  
力者陽明也脈浮而弦小者少陽也若明此三法而施治不中者難矣  
但中風之人尚可淹延歲月而破傷風始雖在表隨即轉臟多致不救  
大抵內氣虛弱而有鬱熱者得之若內氣壯實而無鬱熱者雖傷而無  
害也。

○一論破傷風邪初在表者急服此藥以解之。稍遲則邪入於裏與此藥  
不相合矣。

羌活防風湯

羌活

防風

藁本

川芎

白芍

當歸

地榆

細辛

甘草各一錢

右剉水煎熱服

○一論破傷風在表半重急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣  
和解湯

羌活

防風

川芎

菊花

麻黃

石膏

前胡

黃芩

細辛

枳殼

白茯苓

蔓荊子

甘草各五

薄荷

白芷各二分半

右剉水煎熱服

○一論破傷風邪傳入裏一舌強口噤項背反張筋惕抽搐痰涎壅盛胸腹滿悶便秘閉赤時或汗出脉洪數而弦也宜導之

通裏湯

川芎

羌活

黃芩

大黃 各二錢

右剉水煎溫服。臟腑通利為度。

○一論風傷腎而腰痛者。或左或右痛無常處。牽引兩足宜

五積散加防風全蝎二箇。方見中寒。

○一論破傷風及金刃傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛生肌。

玉真散

天南星 為防風所制服之不麻。

防風

右各等分為細末。破傷風以藥敷口。然後以溫酒調一錢如牙關緊急。角弓反張用藥二錢童便調下。○打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢并進二服。○癩狗咬破先口嚼桑水洗淨用綿拭乾貼藥更不洩發無無大効。

○一治破傷風

初覺有風急取熟艾堆內螻蛄蟲一二箇用手捏住待虫口中吐出

水就抹破處。身穿稍厚衣裳。待少時。瘡口覺麻。兩脇微汗出。立効。如風寒急過。取此蟲三五箇。剪去尾肚。內黃水自出。塗瘡口。再滴此少熱酒飲之。汗出立効。爛草房上亦有此蟲。

○一治破傷風五七日未愈。已至角弓反張。牙關緊急。服之神効。  
蟬退去頭足土淨。五錢。

右爲末。用好酒一碗煎滾服之。立愈。

○一治破傷風

奪命丹

川烏火煎去黑皮一兩 雄黃一錢

右爲末。葱汁爲丸。如蓮子大。每服一丸。用葱葉一片。將藥裹內。火微燒。嚼爛。黃酒下。衣蓋汗出即愈。

灸法 治破傷風及風犬咬傷。方見灸法。

○一治破傷風牙關緊急。

立効散

雄黃

香白芷

右各等分。好酒煎服。如牙關緊急者。灌之即活。

# 湯火

凡遇湯火所傷。切勿用冷水。冷水蓋熱氣。待氣則却。深搗爛入筋。骨慎之。慎之。先以鹽末和米醋調敷。瘡上。次以醋泥塗之。仍用醋塗。不絕。暫救痛苦。下面急搗生地黄醋調敷。瘡上。直候疼止。雖厚至數寸。不

○一切湯火傷。呪云。龍樹王如來。授吾行持。北方壬癸。禁火太法。

龍樹王如來。吾是北方壬癸。水收斬。天下火星。辰千里。火星辰。急急如律令。

呪畢。即搗真武印。吹之。即用少許水洗。雖火燒手足成瘡。亦可療。

一治湯火被火燒破。瘡毒疼痛。三方俱効。

○一方用入黃末蜜和塗之立愈

○一方用雞子清磨京墨塗之上用二層濕紙蓋之

○一方用生白礬為末香油調搗瘡破處不拘時

○一治湯火傷

用穉猪毛不拘多少焙乾燒灰存性研細末與香油調量患處大小周圍厚敷於上中留一孔一日一次慢上圍搗如熱急速及不開口則潰而有疤痕矣

○一治湯盪火燒此藥止痛解毒生血

清涼膏

生地黃 二兩

黃連

山梔子

白芷 各一兩

葱白 十根

右剉細用香油四兩煎至地黃等焦黑濾去渣再煎入黃蠟五錢慢火熬蠟化傾磁盆內以雞翎掃瘡上

○一治湯火燒瘡

家園生地黄旋取新者搗取自然汁入香油黃蜡少許砂鍋內熬成膏以雞翎掃敷瘡上

○一湯火傷用水磨炭末塗○或磨土朱塗○或用真桐油塗

○一方用蒜頭切開水磨濃漿敷之立効

○一方用黃柏爲末香油調搽立已

# 虫獸

○一癩狗咬方

斑猫

下日二日三日

至七日止用七箇以七日外計日每日一箇可

雄黃二錢

麝香

三分小兒不用亦可或用二三厘

滑石

五六錢或一二兩亦可

右俱觀人稟氣虛實用糯米一勺與斑猫同炒以赤爲度斑猫去頭尾

翅足各爲細末每帖用一二三茶匙酒調服如不飲酒米湯亦可服藥去毒物於小便中出或口吐出都是大小塊子毒出後於瘡口下共三寸灸三壯効○先喫香油一碗次用油洗瘡口○又沙糖水調塗仍服沙糖水一兩碗

○一被火傷

用生葛根汁服并洗傷處或白礬末納瘡口痛即止

○一被驟馬咬

用馬鞭草燒灰油調敷之

○一百蟲入耳

用藍汁灌之或葱汁尤良或猪肉少許炙香置耳邊亦出或蒜管入耳內口吸之虫隨出

○一獺狗咬傷

番木鱉即馬錢子磨末吃即看腦頂上有紅頭髮急宜扯去



○一蟻螫方

朱砂

雄黃

膽礬

右各等分。射香減半。端午日取蝦蟆新落酥和為丸。一擦立止。

○一癩狗咬傷神方

斑猫去翅足七箇

香附七分

右共為細末。作一服燒酒調下。如腹痛不可忍。者吃豬肉湯一兩。口解之。即止。不一時。小便出如狗形。下來。即已。避燥。設風。一七日。

○一蜈蚣入耳以雞肉置耳邊自出。

○一蜈蚣咬痛不可忍。用燒紙捲緊。燒烟薰咬處立止。○一方用紡線根。

插酒吃立止。

○一蜈蚣咬痛不止。獨蒜摩敷處痛止。○又宜烏雞糞水調塗之。○又宜

蜈蚣研敷之。

○一蛇咬

雄黃

五聖散

白芷

貝母

右各等分爲末每服二錢熱酒調服又以白礬煎湯水化洗傷處効

一蛇咬 端牛製

雄黃

白礬生研

右各等分爲末湯酒調服爲九如梧子大每服七丸金藥王菩薩藥王菩薩七遍藥水送下

一蝎螫人

雄蝎螫人痛在一處雖蝎螫入諸處痛但將蝎牛搗爛塗之即愈  
即解散蝎牛食蝎故也手浸冷水痛亦止

一治蝎螫

天南星 三箇

膽礬 五錢

右用焰硝半斤化成水入三升末搗切薄成錠子每遇蝎螫之處  
又治牙疼用雄酒入此錠小許漱白數次即止

○一治

用等道並研生酒吞凡被所傷將綿帛扎住勿令氣上行服藥後即當解去不然則所傷之處必潰爛矣

○一風犬咬人急於無風處以冷水洗淨即服韭菜汁一碗隔七日又下碗四十九日共七碗百自忌食魚腥終身忌狗肉方得保全否則立傷九死一風犬一日咬三人止一人用此方得活親試其驗一風犬咬人傳世處立愈

○一辟

薺草

練花

羌花

苦參

藜蘆

川烏

右共為末藥肉為丸日乾燃之○又方用黃鱗骨同錫末搗碎

○一辟

魚乾於室內燒之即化為水矣

○一凡蛇入七竅劈開蛇尾納川椒數粒以帛封之其蛇自出更煎人參湯飲之或飲酒食蒜以解內毒如被蛇咬食蒜飲酒更用蒜榨爛塗患處加艾於蒜上灸之其毒自解凡毒蟲傷並效

○一金猫辟鼠法

椿樹葉

冬青葉

絲瓜梗葉

右各葉分每四季燒烟薰于室中其鼠遠避一年燒四次

○一治蟲入耳

用獨尿滴耳中即出取猫尿以生薑葉擦耳其尿自出或將好蠟則蟲死難出或用炒芝麻按之則虫亦出更不如蜜房之效也

○一治百蟲入耳

楊韭汁灌耳中即瘥○又宜川椒末一撮以醋半盞調下連服十四步即出○又宜火熨繩葉搗之取汁灌耳中○又宜葱汁灌耳中蟲即出

○一治蟻入耳

用穿山甲燒存性爲末水調灌之即出

○一百蟲入耳不出

以雞冠血滴入耳中即出

○一蟻螞入耳

地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蟻螞亦化爲水

○一黃蜂螫

以熱酒洗之立効或用清油搽上即愈

○一辟蚊蟲

用菰荊子爲末入人言末加艾以帛捲燒烟薰之

○一辟壁虱臭蟲

用蜈蚣燒烟薰之○一方青鹽水灌洗床帳永絕其迹